

INDIANA 2018–19

Vacunas escolares requeridas y recomendadas



	REQUERIDA		RECOMENDADA
3 a 5 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) • 3 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicela • 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual
Kínder a 4to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela • 2 Hepatitis A 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual
5to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 Hepatitis A
6to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 HPV (Virus del papiloma humano)
7mo. a 11vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 Hepatitis A • 2/3 HPV
12vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual • 2 MenB (antimeningocócica) • 2/3 HPV

El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

Hep B: La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

DTaP: 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después.

Polio: *3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior, y si se usó sólo un tipo de vacuna (todas OPV [orales] o todas IPV [inactivas])

*Para los alumnos en Kínder a 8vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumpla 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación médica sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 10mo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 11vo. y 12vo. grados.

Tdap: No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad sólo necesitan una dosis de MCV4.

Hep A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kínder a 4to. grado, 6to. y 12vo. grados.

*Para los grados 5to., y 7mo. a 11vo., se recomiendan 2 dosis de vacuna contra Hep A.



Para obtener más información sobre las vacunas, visite vaccinateindiana.org